

塞浦路斯强奸和性侵犯受害者治疗意识信息

接触后预防 (PEP)

PEP 涉及潜在接触后尽快服用抗艾滋病病毒药物 已经接触艾滋病病毒？警钟正在敲响！



防止艾滋病病毒感染



接触后 72 小时内开始,

PEP 才会起作用

什么是 PEP ?

PEP 代表接触后预防。这意味着在可能接触艾滋病病毒后服用抗逆转录病毒药物 (ART) 以防止感染。

PEP 必须在最近可能接触艾滋病病毒后 72 小时内开始使用，但是越早使用 PEP 越好。每一小时都是至关重要的。如果医生给你开了 PEP，你需要每天服用一两次，持续 28 天。PEP 在正确使用时有有效预防 HIV，但不是 100%。

PEP 有副作用吗？

PEP 是安全的，但有些人可能会引起恶心等副作用。这些副作用可以治疗，不会危及生命。

哪里可以获得治疗

Grigoris 诊所六楼
拉纳卡总医院
美利坚合众国大街
拉纳卡 6301

电话：+357 24800466/464

营业时间 - 周一至周五
早上八点到下午一点

免责声明

这份资料由尼科西亚英国高级专员公署领事处汇编。如果本讲义中的任何信息不正确，请提请我们注意不正确之处，以便我们进行修改。英国高级专员公署对所提供的信息不负责任，并可随时更改。